

اثر زمان و غلظت محلول پاشی کودهای مختلف بر خصوصیات فیزیکی-شیمیایی میوه و عملکرد عناب (*Ziziphus jujube*)

فاطمه نخعی، استادیار گروه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیرجند

Nakhaeif@iaubir.ac.ir

دریافت: ۱۳۹۳/۰۷/۱

پذیرش: ۱۳۹۴/۰۲/۱۷

چکیده

گیاه عناب (*Ziziphus jujube*) به طور وسیعی در استان خراسان جنوبی پرورش می‌یابد. این گونه، درختی سازگار به مناطق خشک و گرم است. در این تحقیق اوره در پنج غلظت (صفر، ۱، ۲، ۳ و ۴ درصد)، اسیدبوریک، سولفات‌آهن و سولفات‌روی هر کدام با پنج غلظت (صفر، ۱۵۰۰، ۲۵۰۰، ۳۵۰۰ و ۴۵۰۰ میلی‌گرم در لیتر) به تهیی و همه کودها توام با همدهیگر در سه زمان مختلف قبل از گلدهی، قبل از گلدهی + ۳۰ روز پس از ریزش گلبرگ‌ها و ۳۰ روز پس از ریزش گلبرگ‌ها بر روی عناب محلول‌پاشی گردید. این آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که محلول‌پاشی در زمان‌های قبل از گلدهی و قبل از گلدهی + ۳۰ روز پس از ریزش گلبرگ‌ها سبب افزایش معنی‌دار اندازه میوه (طول و قطر)، وزن میوه، عملکرد و TSS نسبت به محلول‌پاشی سولفات‌آهن و سولفات‌روی شد. همه غلظتها نسبت به شاهد، اندازه میوه (طول و قطر)، وزن میوه، عملکرد و TSS را به طور معنی‌داری افزایش دادند. محلول‌پاشی کودها تاثیر معنی‌داری بر دیگر خصوصیات شیمیایی میوه (ویتامین‌ث، pH، اسیدیته و مقدار کارتنوئید) نداشت.

واژگان کلیدی: اسیدبوریک؛ اوره؛ عملکرد؛ محلول‌پاشی برگی؛ بیرجند.

مقدمه

این خاک‌ها به دلیل pH بالا و کمبود عناصر کم‌صرف و مواد آلی همواره با مشکل همراه بوده است. در این خاک‌ها به علت وجود pH قلیایی و غلظت بالای یون کلسیم، بعضی از عناصر غذایی که قابلیت جذب آنها توسط pH کنترل می‌شود، به صورت ترکیباتی غیر محلول و غیر قابل استفاده برای گیاه در می‌آیند. از طرفی در خاک‌های آهکی مقدار زیادی یون بی‌کربنات تولید می‌شود که این یون ضمن افزایش pH خاک باعث کاهش قابلیت جذب عناصر کم‌صرف، به خصوص آهن می‌گردد [۲۵].

محلول‌پاشی برگی برای بهبود علائم کمبود عناصر کم‌صرف مفید است. آهن با پروتئین‌ها برای تشکیل آنزیم‌های مهم در گیاهان پیوند تشکیل می‌دهد. روی از ترکیبات تشکیل دهنده خیلی از آنزیم‌های گیاهی است.

عناب با نام علمی *Ziziphus jujube* متعلق به خانواده Rhamnaceae است. بیش از ۹۰ درصد از سطح زیر کشت عناب ایران در استان خراسان جنوبی است. این درختان بخوبی با خشکی شدید، گرما و محیط‌های بیابانی سازگار هستند [۹]. میوه عناب منبع غنی از ویتامین‌ث، پروتئین و اسیدهای آمینه حتی بیشتر از پرتقال و سیب است [۲۶]. در مورد نیازهای کودی عناب در ایران تحقیقات ناچیزی انجام و اطلاعات چندانی وجود ندارد. تقدیمه در دوران رشد میوه یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر خصوصیات میوه است [۲۴]. مصرف بهینه عناصر غذایی یکی از راهکارهای مؤثر در افزایش عملکرد درختان از جمله عناب است. به دلیل اینکه بخش زیادی از خاک‌های ایران، به خصوص مناطق پرورش عناب، آهکی است، تولید محصول زیاد در

گرم استفاده شد. تکرارها در این تحقیق، درختانی با سن، قدرت و اندازه یکسان بودند. جهت جذب بهتر کودها از موبایان تی‌بول استفاده شد. محلول‌پاشی عصر هنگام خنک شدن هوا بر روی کل درخت انجام شد. عملیات داشت بطور عادی و یکنواخت برای همه درختان دنبال شد. در شهریور ماه پس از رسیدگی میوه‌ها برداشت و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی میوه و عملکرد درختان بررسی شد. طول و قطر میوه بر حسب میلیمتر با کولیس (دقت، 10^{-2} میلی‌متر) و وزن میوه بر حسب گرم با ترازو (دقت، 10^{-4} گرم) اندازه‌گیری شد. پنجاه عدد میوه از هر تکرار بطور تصادفی انتخاب و پس از اندازه‌گیری این صفات، میانگین آنها تعیین گردید. عملکرد بر حسب کیلوگرم میوه تولیدی درخت برآورد گردید.

مجموع مواد جامد قابل حل (TSS) با دستگاه رفرکتومتر دستی و pH با دستگاه pH متر اندازه‌گیری شد. برای اندازه‌گیری اسیدیته قابل تیتراسیون، ۲۰ میلی‌لیتر از عصاره با 80 میلی‌لیتر آب مقطر رقیق و تیتراسیون با سود 10 نرمال با استفاده از معرف فنل فتالئین انجام شد. میزان اسید موجود در عصاره بر حسب میلی‌گرم در 100 میلی‌لیتر محاسبه شد [۱۱]. کارتنتوئید کل با روش اولسون با دستگاه اسپیکتوفتومتر اندازه‌گیری شد. برای این منظور میوه‌ها له و محلول هگزان- اتانول به نسبت 9 (هگزان) به 1 (اتanol) به آنها افزوده و سپس به مدت 5 دقیقه با سانتریفیوز با دور 10000 به طور کامل بهم زده شد. پس از صاف کردن عصاره‌ها، جذب با دستگاه طیف سنج در طول موج 480 نانومتر خوانده شد و با استفاده از رابطه (1) میزان کارتنتوئید کل محاسبه شد.

$$(1) [\mu\text{g/g}] = A \times V \times 10^6 / 2500 \times 100 \times g$$

که در آن: $[\mu\text{g/g}]$ مجموع کارتنتوئید، V حجم نهایی، g وزن نمونه و A جذب حداکثر می‌باشد [۲۰].

ویتامین‌ث با روش تیتراسیون دو مرحله‌ای اکسیداسیون و احیا اندازه گیری شد. [۷]. داده‌ها با نرم افزار SAS نسخه $9/1$ ، بصورت آزمایش فاکتوریل اختلاط یافته (به علت زیاد بودن تعداد تیمارها) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت [۲۱] و مقایسات میانگین‌ها با استفاده از روش دانکن صورت گرفت.

بنابراین در فرآیندهای گیاهی به ویژه در ساخت هورمون اسیدایندول‌استیک (IAA) نقش دارد [۱۰]. نیتروژن نیز در ساخت آنزیم‌ها دخالت داشته و تقسیم سلولی و اندازه سلول را افزایش می‌دهد [۲۵]. همچنین با اثر بر فعالیت آنزیم‌های موثر بر فتوسنتر باعث افزایش فتوسنتر می‌گردد [۲۴ و ۲]. محلول‌پاشی نیتروژن در بهار به دلیل افزایش سطح برگ، فتوسنتر را افزایش می‌دهد [۶]. گزارش شده است که محلول‌پاشی با اوره اندازه میوه و عملکرد عناب را افزایش می‌دهد [۲۶، ۱۵ و ۵]. همچنین محلول‌پاشی با اسیدبوریک نیز باعث افزایش اندازه میوه و عملکرد عناب شده است [۱۸ و ۲۸]. در این تحقیق اثر محلول‌پاشی با غلظت‌های مختلف اوره، اسیدبوریک، سولفات‌آهن و سولفات‌روی به تنها یی و توام با هم‌دیگر در زمان‌های متفاوت بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و عملکرد عناب می‌شود.

مواد و روش‌ها

این آزمایش در باغ تحقیقاتی عناب دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرون‌جند (عرض جغرافیایی ۳۲ درجه و ۵۲ دقیقه شمالی و طول جغرافیایی ۵۹ درجه و ۱۳ دقیقه شرقی) و در ارتفاع ۱۴۱۰ متر بالاتر از سطح دریا انجام شد. این تحقیق با آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوك کامل تصادفی با سه تکرار انجام گردید. کودهای اوره با غلظت‌های صفر، ۱ ، ۲ ، ۳ و ۴ درصد، اسیدبوریک، سولفات‌آهن و سولفات‌روی هر کدام با غلظت‌های صفر، ۱۵۰۰ ، ۲۵۰۰ ، ۳۵۰۰ و ۴۵۰۰ میلی‌گرم در لیتر به تنها یی و همه کودها توام با هم‌دیگر (اوره + اسیدبوریک + سولفات‌آهن + سولفات‌روی) با غلظت‌های (اوره صفر درصد + دیگر کودها هر کدام صفر میلی‌گرم در لیتر)، (اوره ۱ درصد + دیگر کودها هر کدام ۱۵۰۰ میلی‌گرم در لیتر)، (اوره ۲ درصد + دیگر کودها هر کدام ۲۵۰۰ میلی‌گرم در لیتر)، (اوره ۳ درصد + دیگر کودها هر کدام ۳۵۰۰ میلی‌گرم در لیتر)، (اوره ۴ درصد + دیگر کودها هر کدام ۴۵۰۰ میلی‌گرم در لیتر)، (اوره ۴ درصد + دیگر کودها هر کدام ۴۵۰۰ میلی‌گرم در لیتر) در سه زمان مختلف قبل از گلدهی، قبل از گلدهی + ۳۰ روز پس از ریزش گلبرگ‌ها و ۳۰ پس از ریزش گلبرگ‌ها بر روی درختان عناب محلول پاشی شدند. برای محلول‌سازی اسیدبوریک از اتانول و آب

نتایج

(جدول ۵). بنابراین، کودهای اوره، اسیدبوریک و محلولپاشی توام همه کودها هر چند که اثر معنی داری در بهبود خصوصیات عناب دارند، اما اگر دیرهنگام محلولپاشی گردند تاثیری نخواهند داشت.

بررسی اثر متقابل زمان محلولپاشی و غلظت کودها نشان داد که همه غلظت‌های محلولپاشی شده در زمان‌های قبل از گلدهی و قبل از گلدهی + ۳۰ روز پس از ریزش گلبرگ‌ها باعث افزایش معنی دار طول میوه، عملکرد و وزن میوه (به استثنای پایین‌ترین غلظت) و محلولپاشی با دو غلظت بالاتر در زمان قبل از گلدهی و همه غلظت‌ها در زمان قبل از گلدهی + ۳۰ روز پس از ریزش گلبرگ‌ها باعث افزایش معنی دار نسبت به شاهد شده‌اند. بیشترین عملکرد (۱۵/۳۸ و ۱۵/۲۰ کیلوگرم در درخت) به ترتیب مربوط به به بالاترین غلظت محلولپاشی در زمان‌های قبل از گلدهی و قبل از گلدهی + ۳۰ روز پس از ریزش گلبرگ‌ها بود. هیچ‌کدام از غلظت‌های محلولپاشی شده در زمان ۳۰ روز پس از ریزش گلبرگ‌ها تاثیر معنی داری در صفات ذکر شده نداشتند (جدول ۶). پس محلولپاشی دیرهنگام عناب حتی با غلظت‌های بالا نمی‌تواند موثر واقع گردد.

اثرات متقابل نوع کود و غلظت نشان داد که محلولپاشی اوره، اسیدبوریک و محلولپاشی توام همه کودها با تمامی غلظت‌های محلولپاشی شده طول میوه و به استثنای پایین‌ترین غلظت قطر و وزن میوه را نسبت به شاهد و همه غلظت‌های سولفات‌روی و سولفات‌آهن به طور معنی داری افزایش داده‌اند. محلولپاشی اوره و اسیدبوریک با دو غلظت بالاتر و محلولپاشی توام همه کودها با تمامی غلظت‌ها، عملکرد را نیز نسبت به شاهد و تمامی غلظت‌های سولفات‌روی و سولفات‌آهن افزایش معنی دار داشته‌اند. هر چند بین غلظت‌های مختلف هر کود تفاوت معنی دار مشاهده نگردید.

محلولپاشی اوره و محلولپاشی توام همه کودها بالاترین غلظت نسبت به پایین‌ترین غلظت هر کود اندازه میوه (طول و قطر)، وزن میوه و عملکرد را به طور معنی داری افزایش دادند. بیشترین عملکرد (۱۵/۴۲ و ۱۵/۷۵ کیلوگرم در درخت) به ترتیب مربوط به اوره ۴٪ و اوره ۴٪ + دیگر کودها (اسیدبوریک، سولفات‌آهن،

تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد که اثر زمان، نوع کود، غلظت کود و اثرات متقابل زمان و نوع کود، زمان و غلظت کود، نوع کود و غلظت کود بر اندازه میوه (طول و قطر)، وزن میوه، عملکرد و TSS معنی دار است، ولی بر اسیدیته، مقدار کارتونیئید، ویتامین‌ث و pH تاثیر معنی داری ندارند (جدول ۱). محلولپاشی در زمان‌های قبل از گلدهی و قبل از گلدهی + ۳۰ روز پس از ریزش گلبرگ‌ها، باعث افزایش معنی دار اندازه میوه (طول و قطر)، وزن میوه، عملکرد و TSS نسبت به زمان ۳۰ روز پس از ریزش گلبرگ‌ها گردید. هر چند بین این دو زمان محلولپاشی اختلاف معنی داری مشاهده نشد (جدول ۲). که نشان دهنده این است که محلولپاشی دیرهنگام نمی‌تواند موثر باشد. محلولپاشی با کودهای اوره، اسیدبوریک و مخلوط کودها، اندازه میوه (طول و قطر)، وزن میوه، عملکرد و TSS را نسبت به سولفات‌آهن و سولفات‌روی بطور معنی داری مشاهده نگردید، به استثنای اوره و اسیدبوریک که TSS را نسبت به محلولپاشی توام همه کودها افزایش معنی دار دادند (جدول ۳).

همه غلظت‌های محلولپاشی نیز باعث افزایش معنی دار طول میوه، وزن میوه، عملکرد، TSS و قطر میوه (به استثنای پایین‌ترین غلظت) نسبت به شاهد شد و بالاترین غلظت، بیشترین افزایش را در این صفات نشان داد (جدول ۴). اثر متقابل زمان و نوع کود نشان داد که محلولپاشی اوره، اسیدبوریک و محلولپاشی توام همه کودها در زمان‌های قبل از گلدهی و قبل از گلدهی + ۳۰ روز پس از ریزش گلبرگ‌ها سبب افزایش معنی دار اندازه میوه (طول و قطر)، وزن میوه، عملکرد و TSS نسبت به سولفات‌آهن و سولفات‌روی در همین زمان‌ها و همه کودهای محلولپاشی شده در زمان ۳۰ روز پس از ریزش گلبرگ‌ها گردید. هیچ‌کدام از کودهای محلولپاشی شده در زمان ۳۰ روز پس از ریزش گلبرگ‌ها تاثیر معنی داری بر خصوصیات ذکر شده نسبت به دو زمان دیگر محلولپاشی نداشتند. بیشترین عملکرد (۱۵/۳۴ و ۱۵/۱۶ کیلوگرم در درخت) به ترتیب مربوط به محلولپاشی اوره و محلولپاشی توام همه کودها در زمان قبل از گلدهی بود.

غلهای بالا تاثیر معنی‌داری بر هیچ‌کدام از خصوصیات سولفات‌روی) هر کدام ۴۵۰۰ میلی‌گرم در لیتر بود. محلول‌پاشی با سولفات‌آهن و سولفات‌روی حتی با اندازه‌گیری شده نداشت (جدول ۷).

جدول ۱. تجزیه واریانس زمان و غلظت محلول‌پاشی کودها بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و عملکرد عناب

منبع تغییرات	درجه آزادی	وزن میوه	طول میوه	قطر میوه	ویتامین ث	pH	TSS	اسیدیته	کارتونید	عملکرد	میانگین مربعات	
											ns	ns
تکرار	۲	۰/۲۶۶***	۰/۲۵۶***	۰/۲۶۱***	۲۴۳/۳۵۰	۰/۱۶۳۰	۰/۴۱۳***	۰/۰۰۲۵	۰/۰۰۷۹	۰/۳۳***	۰/۳۳***	
زمان	۲	۱۱۸/۸۸***	۳/۴۳***	۷/۳۶۱***	۷/۳۱۶	۰/۰۰۰۰۱	۲۱/۱۶۵***	۰/۰۰۰۸	۰/۰۱۳۲	/۴۳۹***	/۴۳۹***	
کود	۳	۵۲/۹۹۹***	۱/۳۳۶***	۱۲۷/۵۹	۰/۰۰۲۳	۰/۰۰۱۸	۱۰/۹۷۹***	۰/۰۰۰۰۱	۰/۰۰۲۵	/۷۸۱***	/۷۸۱***	
غلظت	۴	۴۱/۷۰۴***	۲/۸۷۳***	۲۳/۵۶۴	۰/۰۰۲۳	۰/۰۰۰۷	۵/۸۴۶***	۰/۰۰۰۰۷	۰/۰۰۳۹	۹/۵۴۶***	۹/۵۴۶***	
زمان و کود	۶	۱۳/۹۵۲***	۰/۴۳۳***	۱۲/۱۰۲	۰/۰۰۰۹	۰/۰۰۰۱۷	۲/۲۸۱***	۰/۰۰۰۰۹	۰/۰۱۱۶	۶/۳۳***	۶/۳۳***	
زمان و غلظت	۸	۱۲/۲۵۵***	۰/۳۸۲***	۲/۸۹۳	۰/۰۰۰۰۳	۱/۵۲۶***	۰/۰۰۰۰۳	۰/۰۱۱۴	۰/۰۰۰۰۳	۳/۱۳۷***	۳/۱۳۷***	
کود و غلظت	۱۲	۵/۰۹۹***	۰/۲۰۴***	۲۰/۴۹۴	۰/۰۰۰۰۳	۱/۵۰۷***	۰/۰۰۰۰۸	۰/۰۰۰۵	۰/۰۱۱۶	۱/۸۱۲***	۱/۸۱۲***	
خطا	۱۴۲	۰/۰۶۸	۰/۱۱۹	۳۵/۲۴۶	۰/۰۳۶	۰/۰۰۵۱	۰/۰۰۰۷	۰/۰۱۲۳	۰/۰۱۲۳	۰/۴۶۷	۴/۷۹	
ضریب تغییرات (%)		۲/۶۳	۸/۸۱	۲/۱۵	۸/۸۲	۲/۲۵	۱/۷۲	۱۱/۱۶	۱/۲۶	۱/۲۶		

ns و **: به ترتیب بیانگر عدم اختلاف و اختلاف معنی‌دار در سطح احتمال ۱٪ است.

جدول ۲. مقایسه میانگین زمان محلول‌پاشی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و عملکرد عناب

زمان محلول پاشی	TSS (%)	عملکرد (درخت/kg)	وزن میوه (gr)	طول میوه (mm)	قطر میوه (mm)
PF	۳۴/۲۵ b	۱۴/۲۷ a	۳/۰ ۱ a	۲۰/۳۹ a	۱۶/۱۴ a
30DAPA	۳۳/۴۸ c	۱۳/۱۹ b	۲/۶۶ b	۱۸/۴۴ b	۱۵/۵۶ b
PF+30DAPA	۳۴/۶۰ a	۱۴/۳۰ a	۲/۹۸ a	۲۰/۲۷ a	۱۶/۱۳ a

میانگین‌های دارای حروف مشابه در هر ستون با همدیگر در سطح احتمال ۵٪ اختلاف معنی‌دارند.

PF = قیل از گلدهی، 30DAPA = روز پس از ریزش گلبرگ‌ها.

جدول ۳. مقایسه میانگین اثر نوع کود بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و عملکرد عناب

نوع کود	TSS (%)	عملکرد (درخت/kg)	وزن میوه (gr)	طول میوه (mm)	قطر میوه (mm)
اوره	۳۴/۷۷ a	۱۴/۵۳ a	۳/۰ ۴ a	۲۰/۶۵ a	۱۶/۱۹ a
اسیدبوریک	۳۴/۷۹ a	۱۴/۳۰ a	۳/۰ ۰ a	۲۰/۳۳ a	۱۶/۱۵ a
سولفات‌آهن	۳۳/۴۰ c	۱۳/۱۷ b	۲/۷۱ b	۱۸/۴۲ b	۱۵/۶۱ b
سولفات‌روی	۳۳/۵۸ c	۱۳/۱۴ b	۲/۶۴ b	۱۸/۳۷ b	۱۵/۵۳ b
همه کودها	۳۴/۰ ۱ b	۱۴/۴۷ a	۳/۰ ۳ a	۲۰/۷۳ a	۱۶/۲۴ a

میانگین‌های دارای حروف مشابه در هر ستون با همدیگر در سطح احتمال ۵٪ اختلاف معنی‌دارند.

همه کودها= اوره + اسیدبوریک + سولفات‌آهن + سولفات‌روی.

جدول ۴. مقایسه میانگین اثر غلظت‌های مختلف کودها بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و عملکرد عناب

غلظت	TSS (%)	عملکرد (درخت/kg)	وزن میوه (gr)	طول میوه (mm)	قطر میوه (mm)
اوره٪ و دیگر کودها هر کدام ۰ میلی گرم در لیتر	۳۳/۵۲ b	۱۳/۱۴ d	۲/۵۷ d	۱۸/۲۴ c	۱۵/۶۷ c
اوره٪ و دیگر کودها هر کدام ۱۵۰۰ میلی گرم در لیتر	۳۴/۱۵ a	۱۳/۶۷ c	۲/۷۶ c	۱۹/۶۷ b	۱۵/۷۸ c
اوره٪ و دیگر کودها هر کدام ۲۵۰۰ میلی گرم در لیتر	۳۴/۱۹ a	۱۳/۸۹ bc	۲/۹۵ b	۲۰/۰۱ ab	۱۵/۹۹ b
اوره٪ و دیگر کودها هر کدام ۳۵۰۰ میلی گرم در لیتر	۳۴/۲۹ a	۱۴/۲۴ b	۲/۹۸ b	۲۰/۳۶ a	۱۶/۰۶
اوره٪ و دیگر کودها هر کدام ۴۵۰۰ میلی گرم در لیتر	۳۴/۴۰ a	۱۴/۶۵ a	۳/۱۴ a	۲۰/۲۱ a	۱۶/۲۲ a

میانگین‌های دارای حروف مشابه در هر ستون با همدیگر در سطح احتمال ۵٪ اختلاف معنی‌دار ندارند.

دیگر کودها = اسیدبوریک + سولفات آهن + سولفات روی

جدول ۵. مقایسه میانگین اثر متقابل زمان محلول پاشی و نوع کود بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و عملکرد عناب

نوع کود و زمان	TSS (%)	عملکرد (درخت/kg)	وزن میوه (gr)	طول میوه (mm)	قطر میوه (mm)
PFه	۳۵/۳۵ a	۱۵/۳۴ a	۳/۲۴ a	۲۱/۷۵ a	۱۶/۵۴ a
PF	۳۵/۳۷ a	۱۴/۷۶ a	۳/۱۶ a	۲۱/۴۱ a	۱۶/۴۵ a
PF آهن	۳۳/۴۱ b	۱۳/۰۲ b	۲/۷۳ b	۱۸/۴۱ b	۱۵/۶۲ b
PF روی	۳۳/۶۲ b	۱۳/۰۹ b	۲/۶۶ b	۱۸/۴۰ b	۱۵/۵۵ b
PF کودها	۳۴/۴۸ a	۱۵/۱۶ a	۳/۲۴ a	۲۱/۹۶ a	۱۶/۵۴ a
۳۰DAPAه	۳۳/۵۴ b	۱۳/۱۴ b	۲/۷۳ b	۱۸/۵۸ b	۱۵/۵۶ b
اسیدبوریک	۳۳/۴۵ b	۱۳/۰۷ b	۲/۶۰ b	۱۸/۳۷ b	۱۵/۵۹ b
۳۰DAPA آهن	۳۳/۳۹ b	۱۳/۳۰ b	۲/۷۱ b	۱۸/۵۴ b	۱۵/۵۹ b
۳۰DAPA روی	۳۳/۶۱ b	۱۳/۱۶ b	۲/۶۲ b	۱۸/۳۱ b	۱۵/۵۲ b
۳۰DAPA کودها	۳۳/۴۰ b	۱۳/۲۶ b	۲/۶۵ b	۱۸/۴۲ b	۱۵/۵۶ b
PF+۳۰DAPAه	۳۵/۴۳ a	۱۵/۱۱ a	۳/۱۶ a	۲۱/۶۱ a	۱۶/۴۷ a
اسیدبوریک	۳۵/۵۴ a	۱۵/۰۶ a	۳/۲۲ a	۲۱/۲۲ a	۱۶/۴۲ a
۳۰DAPA آهن	۳۳/۴۱ b	۱۳/۱۸ b	۲/۶۸ b	۱۸/۳۱ b	۱۵/۶۲ b
۳۰DAPA روی	۳۳/۵۰ b	۱۳/۱۶ b	۲/۶۳ b	۱۸/۴۱ b	۱۵/۵۲ b
۳۰DAPA کودها	۳۵/۱۴ a	۱۴/۹۸ a	۳/۲۱ a	۲۱/۷۹ a	۱۶/۶۱ a

میانگین‌های دارای حروف مشابه در هر ستون با همدیگر در سطح احتمال ۵٪ اختلاف معنی‌دار ندارند.

جدول ۶. مقایسه میانگین اثر متقابل زمان محلول پاشی و غلظت بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و عملکرد عناب

زمان و غلظت	عملکرد	TSS (%)	وزن میوه (gr)	طول میوه (mm)	قطر میوه (mm)
اوره٪ و دیگر کودها هر کدام ۰ میلی گرم در لیتر	۱۲/۰۷ e	۳۳/۶۰ cde	۲/۵۸ de	۱۸/۱۸ d	۱۵/۶۷ bc
اوره٪ و دیگر کودها هر کدام ۱۵۰۰ میلی گرم در لیتر	۱۴/۰۰ bcd	۳۴/۲۰ bcd	۲/۸۱ cd	۲۰/۲۶ bc	۱۵/۹۱ b
اوره٪ و دیگر کودها هر کدام ۲۵۰۰ میلی گرم در لیتر	۱۴/۲۹ b	۳۴/۳۴ bc	۳/۰۷ bc	۲۰/۷۵ abc	۱۶/۳۱ ab
اوره٪ و دیگر کودها هر کدام ۳۵۰۰ میلی گرم در لیتر	۱۴/۵۴ a	۳۴/۴۹ ab	۳/۱۵ b	۲۱/۲۲ ab	۱۶/۴۴ ab
اوره٪ و دیگر کودها هر کدام ۴۵۰۰ میلی گرم در لیتر	۱۵/۳۸ a	۳۴/۵۹ ab	۲/۴۳ a	۲۱/۵۲ a	۱۶/۴۸ a
۳۰DAPA و دیگر کودها هر کدام ۰ میلی گرم در لیتر	۱۲/۱۰ e	۳۳/۴۸ de	۲/۵۳ e	۱۸/۴۳ d	۱۵/۶۸ bc
۳۰DAPA و دیگر کودها هر کدام ۱۵۰۰ میلی گرم در لیتر	۱۲/۸۸ e	۳۳/۴۸ de	۲/۶۵ de	۱۸/۵۲ d	۱۵/۴۸ c
۳۰DAPA و دیگر کودها هر کدام ۲۵۰۰ میلی گرم در لیتر	۱۳/۱۷ de	۳۳/۵۳ de	۲/۷۲ de	۱۸/۳۸ d	۱۶/۴۰ c
۳۰DAPA و دیگر کودها هر کدام ۳۵۰۰ میلی گرم در لیتر	۱۳/۴۰ cde	۳۳/۵۱ de	۲/۶۹ de	۱۸/۷۵ d	۱۵/۵۸ bc
۳۰DAPA و دیگر کودها هر کدام ۴۵۰۰ میلی گرم در لیتر	۱۳/۳۸ cde	۳۳/۳۸ e	۲/۷۱ de	۱۸/۱۳ d	۱۵/۶۹ b
PF+30DAPA اوره٪ و دیگر کودها هر کدام ۰ میلی گرم در لیتر	۱۳/۲۴ de	۳۳/۴۷ de	۲/۶۰ de	۱۸/۱۱ d	۱۵/۶۶ bc
PF+30DAPA اوره٪ و دیگر کودها هر کدام ۱۵۰۰ میلی گرم در لیتر	۱۴/۱۴ bc	۳۴/۷۵ ab	۲/۸۳ cd	۲۰/۲۳ c	۱۵/۹۴ b
PF+30DAPA اوره٪ و دیگر کودها هر کدام ۲۵۰۰ میلی گرم در لیتر	۱۴/۲۲ bc	۳۴/۷۰ ab	۳/۰۶ bc	۲۰/۹۰ abc	۱۶/۲۷ ab
PF+30DAPA اوره٪ و دیگر کودها هر کدام ۳۵۰۰ میلی گرم در لیتر	۱۴/۷۰ ab	۳۴/۸۸ ab	۳/۱۱ b	۲۱/۱۲ abc	۱۶/۲۷ ab
PF+30DAPA اوره٪ و دیگر کودها هر کدام ۴۵۰۰ میلی گرم در لیتر	۱۵/۲۰ a	۳۵/۲۳ a	۳/۲۹ ab	۲۰/۹۹ abc	۱۶/۵۰ a

میانگین‌های دارای حروف مشابه در هر ستون با همدیگر در سطح احتمال ۵٪ اختلاف معنی‌داری ندارند.

جدول ۷. مقایسه میانگین اثر متقابل نوع کود و غلظت بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و عملکرد عناب

نوع کود و غلظت	عملکرد (Kg/دخت)	TSS (%)	وزن میوه (gr)	طول میوه (mm)	قطر میوه (mm)
اوره٪	13.03 hi	33.76 efgh	2.59 e	18.04 d	15.56 de
اوره٪	14.2 cdefgh	34.65 abcde	2.85 cde	20.58 b	15.93 bcde
اوره٪	14.53 bcde	34.63 abcde	3.13 abc	21.19 abc	16.35 abc
اوره٪	15.14 abc	35.18 abc	3.18 abc	21.83 ab	16.47 ab
اوره٪	15.75 a	35.65 a	3.44 ab	21.58 ab	16.65 a
اسید بوریک ۰ میلی گرم در لیتر	13.26 fghi	33.29 gh	2.52 e	18.05 d	15.70 de
اسید بوریک ۱۵۰۰ میلی گرم در لیتر	14.02 cdefghi	34.81 abcd	2.82 cde	20.22 c	15.93 bcde
اسید بوریک ۲۵۰۰ میلی گرم در لیتر	14.42 bcdef	35.11 abc	3.10 bed	20.96 abc	16.35 abc
اسید بوریک ۳۵۰۰ میلی گرم در لیتر	14.67 abcd	35.38ab	3.14 abc	21.34 abc	16.31 abc
اسید بوریک ۴۵۰۰ میلی گرم در لیتر	15.11 abc	35.34 abc	3.39 ab	21.10 abc	16.48 ab
سولفات آهن ۰ میلی گرم بر لیتر	13.23 ghi	33.31 gh	2.62 e	18.50 d	15.65 de
سولفات آهن ۱۵۰۰ میلی گرم در لیتر	13.00 i	33.78 defgh	2.65 e	18.55 d	15.53 de
سولفات آهن ۲۵۰۰ میلی گرم در لیتر	13.033 hi	33.67efgh	2.70 e	18.33 d	15.48 de
سولفات آهن ۳۵۰۰ میلی گرم در لیتر	13.24 fghi	33.31 gh	2.74 de	18.55 d	15.61 de
سولفات آهن ۴۵۰۰ میلی گرم در لیتر	13.35 efghi	32.94 h	2.82 cde	18.16 d	15.78 cde
سولفات روسی ۰ میلی گرم در لیتر	13.1 hi	33.73 efgh	2.54 e	18.47 d	15.78 cde
سولفات روسی ۱۵۰۰ میلی گرم در لیتر	12.84 i	33.65 efgh	2.63 e	18.41 d	15.48 de
سولفات روسی ۲۵۰۰ میلی گرم در لیتر	12.87 i	33.58 fgh	2.71 e	18.33 d	15.40 e
سولفات روسی ۳۵۰۰ میلی گرم در لیتر	13.24 fghi	33.17 h	2.72 e	18.43 d	15.43 e
سولفات روسی ۴۵۰۰ میلی گرم در لیتر	13.63 defghi	33.77 efgh	2.57 e	18.23 d	15.54 de
اوره٪ و دیگر کودها هر کدام ۰ میلی گرم در لیتر	13.07 hi	33.49 fgh	2.57 e	18.14 d	15.65 de
اوره٪ و دیگر کودها هر کدام ۱۵۰۰ میلی گرم در لیتر	14.32 bcdefg	33.84 defgh	2.85 cde	20.60 bc	16.02 bcd
اوره٪ و دیگر کودها هر کدام ۲۵۰۰ میلی گرم در لیتر	14.61 abcd	33.96 defgh	3.11 bc	21.24 abc	16.37 ab
اوره٪ و دیگر کودها هر کدام ۳۵۰۰ میلی گرم در لیتر	14.93 abc	34.43 bcdef	3.14 abc	21.66 ab	16.50 ab
اوره٪ و دیگر کودها هر کدام ۴۵۰۰ میلی گرم در لیتر	15.42 ab	34.31 cdef	3.49 a	21.99 a	16.65 a

میانگین‌های دارای حروف مشابه در هر ستون با همدیگر در سطح احتمال ۵٪ اختلاف معنی‌داری ندارند.

بور اثر قابل توجهی بر روند میوه‌دهی دارد. کمبود بور میزان گل‌هایی را که به میوه تبدیل می‌شوند را کاهش می‌دهد. محلول‌پاشی بور قبل از مرحله تمام گل میزان تشکیل میوه در آلوی ایتالیایی، گلابی، گیلاس، بادام، سیب، پرتوغال و انگورفرنگی را افزایش داده است. کمبود بور باعث کاهش انتقال قند به گل‌ها جهت رشد و نمو آنها شده و در نتیجه از میزان شهد گل‌ها کاسته می‌شود. این مسئله نشان می‌دهد که بور فعالیت گردهافشانی را در زمان گلدهی بالا می‌برد و در عمل گردهافشانی بطور مستقیم اثر می‌گذارد. چون گردهافشانی عناب با حشرات انجام می‌گیرد پس محلول‌پاشی با اسیدبوریک می‌تواند مؤثر باشد. بر از طریق افزایش تقسیم سلولی و ساخت اسیدهای نوکلئیک در حین نمو میوه بر تشکیل میوه اثر می‌گذارد [۲۷]. همچنین عنصر بور با انتقال کربوهیدرات‌ها از طریق کمپلکس قند-بور که آسانتر از قند از غشا عبور می‌کند و نیز به دلیل جلوگیری از فعالیت آنزیم IAA اکسیداز که سبب بقای اکسین در گیاه و افزایش تولید سیتوکنین می‌شود، میزان ریزش را کاهش می‌دهد و تشکیل میوه، اندازه میوه و عملکرد را افزایش می‌دهد [۲۷ و ۱۹].

محلول‌پاشی زودهنگام در زمان‌های قبل از گلدهی و قبل از گلدهی + ۳۰ روز پس از ریزش گلبرگ‌ها سبب افزایش معنی‌دار اندازه میوه [طول و قطر]، وزن میوه، عملکرد و TSS نسبت به محلول‌پاشی دیرهنگام ۳۰ روز پس از ریزش گلبرگ‌ها شده است. منحنی رشد میوه عناب سیگموئید مضاعف می‌باشد و رشد زیاد در اولین مرحله رشدی سریع، اهمیت فراوانی در افزایش محصول دارد [۲۹]. در نتیجه، محلول‌پاشی در نخستین مرحله رشدی سریع میوه می‌تواند نسبت به مراحل بعدی موثرتر باشد یعنی اندازه و وزن میوه و در نتیجه عملکرد را افزایش می‌دهد. در این آزمایش محلول‌پاشی با اوره، اسیدبوریک و محلول‌پاشی توام همه کودها، TSS میوه عناب را به طور معنی‌داری افزایش داد. گزارشات مشابهی در این زمینه وجود دارد [۱۵، ۱۴ و ۱۵]. در این آزمایش محلول‌پاشی کودی اثر معنی‌داری بر مقدار کارتونوئیدهای میوه عناب نداشت. همسو با نتایج این آزمایش گزارش‌هایی وجود دارد که محلول‌پاشی اوره و اسیدبوریک

اوره بهنهایی و همراه با دیگر کودها با غلظت‌های مختلف، اندازه میوه (طول و قطر)، وزن و عملکرد را در این آزمایش به طور معنی‌داری افزایش داده است. همسو با نتایج این آزمایش گزارش شده محلول‌پاشی با اوره ۰/۲٪، اوره ۰/۳٪ و محلول‌پاشی اوره ۰/۰۸٪ روی ۰/۲٪ سبب افزایش معنی‌دار اندازه میوه (طول و قطر) و عملکرد عناب نسبت به شاهد گردیده است [۱۵، ۱۶ و ۱۳]. همچنین گزارش شده است که اوره ۰/۲٪ نسبت به اوره ۰/۱٪ و شاهد سبب افزایش معنی‌دار اندازه میوه، وزن میوه و عملکرد شده و ریزش میوه کاهش و نگهداری میوه افزایش معنی‌دار پیدا کرده است [۵]. پژوهشگران اثر مثبت اوره در افزایش عملکرد عناب را به دلیل تاثیر اوره در کاهش ریزش گل و میوه دانسته‌اند [۲۶ و ۲۲]. محلول‌پاشی اوره عملکرد میوه‌های دیگر از جمله انگور عسکری و بادام را افزایش داده است [۱ و ۶].

اوره منبع غنی از نیتروژن برای برگ‌ها و میوه‌ها است. نیتروژن در ساخت آنزیم‌ها دخالت دارد. آنزیم‌ها تشکیل سلول‌های مریستمی، تقسیم سلولی و اندازه سلول را افزایش می‌دهند [۲۵]. با افزایش مقدار نیتروژن مقدار آنزیم‌ها افزایش یافته و اندازه میوه و عملکرد افزایش می‌یابد. همچنین اوره با تأثیر بر فعالیت آنزیم‌های موثر بر فتوسنترز، باعث افزایش میزان فتوسنترز و کربوهیدرات‌ها و به دنبال آن ماده خشک گیاهی و عملکرد محصول می‌گردد [۲۴ و ۲۶]. محلول‌پاشی نیتروژن در بهار باعث تحریک تشکیل اسیدهای آمینه شده و میزان رشد رویشی، سطح برگ و فتوسنتر افزایش می‌یابد. همچنین ذخیره کربوهیدرات‌ها زیاد می‌شود و به دنبال آن تشکیل میوه و عملکرد نیز بطور معنی‌داری افزایش می‌یابد [۶]. شاید به دلیل اینکه محلول‌پاشی دیرهنگام نیتروژن نمی‌تواند تاثیر چندانی در افزایش رشد رویشی و سطح برگ داشته باشد، باعث افزایش اندازه میوه و عملکرد نشده است. اسیدبوریک بهنهایی و توام با دیگر کودها اندازه میوه (طول و قطر)، وزن و عملکرد را در این آزمایش افزایش معنی‌دار داده است. این نتایج همسو با یافته‌های دیگر پژوهشگران است [۱۴، ۱۸ و ۲۸]. همچنین گزارش شده است که اسیدبوریک مقدار محصول تمیزهندی، زیتون و انگور را افزایش می‌دهد [۱۷، ۱۲ و ۸].

زودهنگام (قبل از گلدهی) عناب با اوره، اسیدبوریک و محلولپاشی توان این کودها با غلظت‌های مختلف باعث افزایش اندازه میوه (طول و قطر)، وزن میوه، عملکرد و TSS گردید. محلولپاشی دیرهنگام این کودها (۳۰ روز پس از ریزش گلبرگ‌ها) تاثیری در بهبود خصوصیات عناب نداشته است.

References

- [1]. Arshad, M., Grigorian, V., Nazemieh, A., Khalighi, A. & Mostoufi, Y. [2006]. Investigation on effects of spraying nitrogen and boron on fruit qualitative and quantitative characteristics and bearing of *Vitis vinifera*. cv. Soltani. *Iranian Journal of Horticultural Science and Technology*, 7[2], 123-134, (in Farsi).
- [2]. Arzani, K. & Hokmabadi. H. [2002]. Effects of some carbohydrates on qualitative and quantitative traits of pistachio nuts cv. Kalleh-Ghovchi, *Acta Horticulturae*, 594, 291-295.
- [3]. Ashory, M., Ershady, A., Kalhor, M. & Hekmati, J. [2009]. The effect of nutrition urea, iron and zinc on growth, yield and quality grape fruit variety Asghary in khorram abad province, 6th Iranian Horticultural Science Congress, 2013-2015, (in Farsi).
- [4]. Bhati., B.S. & Yadav. P. K. [2002]. Effect of foliar application of urea and NAA on the quality of ber [*Ziziphus mauritiana L.*] cultivar Gola, *Progressive Agriculture*, 2,183-184.
- [5]. Bhati., B.S. & Yadav. P. K. [2004]. Effect of foliar application of urea and NAA on the yield parameters of ber [*Ziziphus mauritiana L.*] cv. Gola. *Haryana Journal of Horticultural Sciences*, 33[3/4], 189-190.
- [6]. Bybordi, A. & Tabatabaei, J. [2008]. Effect of foliar application of sucrose and urea on the fruit set in almond. *Pajouhesh & Sazandegi*, 79:133-141, (in Farsi).
- [7]. Calam, D. [2002]. European Pharmacopoeia, 4th ed, Council of Europe, Strasbourg, P.675.
- [8]. Desouky , I.M., Haggag, L.F., El-Migeed, M., Kishk, Y. & El-Hady, E.S. [2009]. Effect of boron and calcium nutrients sprays on fruit set, oil content and oil quality of some olive oil cultivars. *World Journal of Agricultural Sciences*, 5, 180- 185.
- [9]. Ghouth, K. [2009]. *Ziziphus jujube* The neglected fruit, Saidi manesh Publisher, P, 351, (in Farsi).
- [10]. Hassan, H.S.A., Sarrwy, S.M.A. & Mostafa, E.A.M. [2010]. Effect of foliar spraying with liquid organic fertilizer, some micronutrients, and gibberellins on leaf mineral content, fruit set, yield, and fruit quality of "Hollywood" plum trees. *Agriculture and Biology Journal of North America*, 1[4], 638-643.
- [12]. Hosini, Z. [2009]. Common methods in food analysis. Shiraz: University of Shiraz Press, (in Farsi).
- [13]. Ilango. K. & Vijayalakshmi, C. [2002]. Effect of some growth regulators and chemicals on yield and quality attributes in Tamarind [*Tamarindus indica*], *Orissa Journal of Horticulture*, 30, 35-39.
- [14]. Joon, M.S., Singh, R.R. & Daulta, B.S. [1984]. Effect of foliar spraying of zinc and urea on yield and physico-chemical composition of ber fruit cv.Gola. *Haryana Journal of Horticultural Sciences*, 13[3],110-112.
- [15]. Kamble, A.B. & Desai. U.T. [1996]. Effects of micronutrients on fruit quality of ber, *Journal of Maharashtra Agricultural Universities*, 20[3], 471-472.
- [16]. Katiyar, P., Vikas Yadav, N. & Singh, J.P. [2010]. Effect of preharvest spray NAA, GA₃ and urea on fruiting, fruit quality and yield of ber [*Ziziphus mauritiana Lamk.*] cv.Banarasi, Karaka. *Annals of Horticulture*, 3[1], 92-94.

تأثیری بر مقدار کارتنتوئیدهای میوه عناب نداشته است [۲۳]. همچنین در این آزمایش محلولپاشی اثر معنی‌داری بر اسیدیته و ویتامین‌ث نداشت، هر چند برخلاف نتایج این آزمایش گزارش شده است که محلولپاشی اوره سبب کاهش اسیدیته و افزایش ویتامین‌ث عناب شده است [۴]. همچنین بر خلاف یافته‌های این آزمایش گزارش شده که محلول پاشی اسیدبوریک و سولفات‌روی، اسیدیته عناب را کاهش و ویتامین‌ث را افزایش داده است [۱۴]. محلولپاشی

- [17]. Kumar, B.P. & Reddy, Y.N. [1998]. Growth yield and quality of ber [Ziziphus mauritiana L.] as influenced by pruning and chemicals, South Indian Horticulture, 1998. 46[3], 344-346.
- [18]. Lavin, A. [1988]. Effect of gibberellic acid and boric acid applied on different dates, on bunch weight in graperine [Vitis vinifera L.] cv. Moscatel Rosada. *Chilean Journal of Agricultural & Animal Sciences*, 4, 35-37.
- [19]. Mishra, S. & Krska, B. [2009]. Effect of different cultural treatments on yield and physical characteristics of *Ziziphus jujube* Mill. Grown in Republic, *Acta Horticulturae*, NO.840,343-346.
- [20]. Nyomora, A.M.S. & Brown, P.H. [1997]. Fall foliar applied boron increases tissue boron concentration and nut set of almond. *Journal of the American Society for Horticultural Science*, 22[3], 405-410.
- [21]. Olsson, M. E., Andersson, S., Waltermark, G., Uggla, M. & Gustavsson, K. E. [2005]. Cartenoids and Phenolics in rose hip. *Acta Horticulturae*. 690:246-252.
- [22]. Peighambari, S. A. [1388]. Experimental designs in agricultural sciences. Tehran: University of Tehran Press, (in Farsi).
- [23]. Rajpal, S., Godara, N., Rajbir Singh, R. & Dahiya, S.S. [2001]. Responses of foliar application of growth regulators and nutrients in ber [Ziziphus mauritiana LMK] cv. Umran. *Haryana Journal of Horticultural Sciences*, 30[3], 161-164.
- [24]. Rajpal, S. N.R. Godara & V.P. Ahlawat. [2002]. Qualitative attributes affected by foliar spraying of nutrients and growth regulators in ber [Ziziphus mauritiana Lamk.] cv. Umran. *Haryana Journal of Horticultural Sciences*, 31[1/2], 23-25.
- [25]. Ramazanian, A., Rahemi, M. & Vazifeshenas, M.R. [2009]. Effects of foliar application of calcium chloride and urea on quantitative and qualitative character eristics of pome granate fruits, *Scientia Horticulturae*, 121, 171-175.
- [26]. Shadmehr, E., Golchin, A. & Shafiei, S. [2009]. Effect of source and amounts of nitrogen and spraying method and microelements on yield and grow character of cucumber [Cucumis sativus] cv. Royal. *Modern Science of Sustainable Agriculture Journal*, 21,23-33, [in Farsi].
- [27]. Sharma, J., Sharma, S.K., Panwar, R.D., Gupta, R.B. & Bhatia, S.K. [2009]. Fruit retention, yield and leaf nutrient of ber as influenced foliar application of nutrients and growth regulators, *Haryana Journal of Horticultural Sciences*, 38[3],203-206.
- [28]. Vezvaei, A., Ghaderi, N., Talaei, A. & Babalar, M. [2001]. Effect of boron and zinc sprays at bloom time and fall on almond fruit set. *Iranian Journal Agricultural Science*, 32 [2], 377-384, [in Farsi].
- [29]. Wang, K.W., Cui, F., Liu, H. & Xike, L. [2000]. Experiment on the renewal of old and weak trees of Jinsixiaozao jujube variety, China Fruits, 3, 25-26.
- [30]. Zhang, C. & Whiting, M.d. [2011]. Improving Bing sweet cherry fruit quality with plant growth regulators, *Scientia Horttticulae*, 127,341-346.

The effect of time and different concentrations of foliar spraying fertilizers on fruit physico - chemical properties and yield of jujube (*Ziziphus jujube*)

F. Nakhaei, Assistant professor, Islamic Azad University of Birjad branch
nakhaeif@iaubir.ac.ir

Received: 27 Mar 2014

Accepted: 07 May 2015

Abstract

Jujube (*Ziziphus jujube*) is cultivated widely in Southern Khorasan province. The tree is adapted to arid and warm regions. In this study, urea at 5 concentrations (0, 1, 2, 3 and 4%), boric acid, iron sulfate and zinc sulfate, each with five concentrations (0, 1500, 2500, 3500 and 4500 mg/lit) alone and in combination with each other were sprayed at three different times before flowering, before flowering + 30 days after petal abscission, and 30 days after petal abscission on jujube. This experiment performed as factorial in the form of randomized complete blocks design with three replications. Results showed that the spray before flowering and before flowering + 30 days after petal abscission caused significant increase in fruit size (length and diameter), fruit weight, yield and Total Soluble Solids (TSS) than spraying in 30 days after petals abscission. Urea, boric acid and urea + boric acid+ iron sulfate + zinc sulfate significantly increased fruit size (length and diameter), fruit weight, yield and TSS in comparison with Iron sulfate and zinc sulfate. All concentrations compared to control, significantly increased fruit size (length and diameter), fruit weight, yield and TSS. Foliar spraying fertilizers had not significant effect on other chemical properties of fruit (Vitamin C, pH, Acidity and amount of carotenoids).

Keywords: Boric acid ; Foliar spraying; Jujube; Urea; Yield; Birjand.